
DISSERTAÇÕES E TESES (1993 à abril de 1994)

1993

LIMA, Carmen Silvia Passos. *Estudo da medula óssea em leucemia mielóide aguda do adulto e suas características clínicas e laboratoriais*. Campinas : [s.n.], 1993. 130p. Tese (Doutorado em Clínica Médica) - Faculdade de Ciências Médicas, UNICAMP, 1993.

RESUMO

Foram estudados 68 pacientes com Leucemia Mielóide Aguda (LMA) ao diagnóstico atendidos no Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de Campinas. Cada paciente foi avaliado clinicamente (história e exame físico) e laboratorialmente (sangue periférico e medula óssea por meio da citologia e histologia). Os resultados deste estudo indicaram que a LMA, em nosso meio, apresenta características clínicas e de sangue periférico semelhantes às descritas para países do hemisfério norte, exceto pelo fato de termos observado frequências maiores dos sintomas fraqueza, febre e sangramento em nossos casos. Os resultados do estudo citológico da medula óssea foram semelhantes às descrições prévias, com exceção das frequências obtidas para os subtipos M1, M3, M4 e M7 da LMA em nossos casos. O estudo citológico mostrou-se superior ao histológico para a realização do diagnóstico, para a identificação dos subtipos da LMA e para a identificação de displasias trilineares. Os resultados do estudo histológico da medula óssea foram semelhantes às descrições da literatura. O estudo histológico mostrou-se superior ao citológico para as avaliações das celularidades, das alterações do estroma, para a quantificação da infiltração da medula óssea por blastos, eosinófilos, linfócitos e plasmócitos. Possibilitou a realização das reações imunohistoquímicas Lisozima (que confirmou a origem mielóide da leucemia) e fator VIII: fator von Willebrand (que identificou a leucemia megacarioblástica).

PASCHOAL, Mário Augusto. *Estudo comparativo das respostas autonômicas cardiorespiratórias entre corredores fundistas, halterofilistas e sedentários*. Campinas : [s.n.], 1993. 180p. Dissertação (Mestrado em Fisiologia do Exercício) - UNICAMP, 1993.

RESUMO

Sabe-se que indivíduos submetidos à constante atividade física, apresentam como resposta, modificações estruturais e funcionais dos aparelhos e sistemas, as quais são peculiares

ao tipo de exercício praticado. O objetivo do presente estudo, foi o de investigar a magnitude destas respostas, enfocando especificamente os controles autonômicos sobre o sistema cardiovascular, comparando-os entre corredores fundistas (F; n=5) e halterofilistas (H; n=5), além de um grupo controle, constituído por sedentários (S; n=5). Para tal, foi realizado um estudo transversal, empregando-se testes funcionais autonômicos não invasivos, como: manobra de Valsalva, manobra postural passiva ("head-up tilt") e o teste do frio ("cold hand test"); além de exercícios físicos dinâmicos (EFD), como um protocolo contínuo=PC (acréscimos de potências de 25 "Watts" minuto a minuto até a axaustão) e um protocolo descontínuo=PD (acréscimos de potências de 25 "watts" a cada 4 minutos, até a FC submáxima). As principais variáveis estudadas foram as influências vago-simpáticas sobre o nó sinusal (envolvendo a frequência cardíaca (FC) durante o EFD, no limiar de anaerobiose (LA) e no pico do esforço), e outras variáveis metabólicas obtidas pela medida direta dos gases exalados durante o PC e o PD (como o consumo de oxigênio = VO_2 , no LA e no pico do esforço = VO_2 pico). No tempo de 0 a 10 segundos da manobra de Valsalva, ocorreu significativa ($p<0,05$) diferença entre os deltas de FC apresentados pelos indivíduos do grupo S (+ 24 bpm) em relação aos H (+ 6 bpm). Durante a manobra postural passiva e o teste do frio, os resultados foram menos expressivos na comparação entre os grupos. Durante o PD, pode-se constatar significativa ($p<0,05$) contribuição simpática para o grupo S em relação ao F nas potências acima de 75 "Watts". Durante o PC obteve-se significativos ($p<0,05$) valores superiores de VO_2 no LA e VO_2 pico para o grupo F (30 e 57 ml/kg/min, respectivamente) em relação aos grupos H (20 e 35 ml/kg/min) e S (18 e 31 ml/kg/min). Estes e outros dados obtidos durante os experimentos demonstraram grandes diferenças na magnitude das contribuições vago-simpáticas sobre o miocárdio, principalmente do grupo F em relação aos demais, revelando que as respectivas adaptações autonômicas foram inerentes ao exercício físico (aeróbico) realizado pelo grupo. Outro achado relevante obtido pelo estudo foi a pequena diferença entre os valores apresentados pelos H em relação ao grupo controle (S), sugerindo que os exercícios de levantamento de pesos em nada contribuíram para modificar significativamente a magnitude das respostas autonômicas investigadas.

SORDI, Mara Regina Lemes de. *Repensando a prática de avaliação no ensino de enfermagem*. Campinas : [s.n.], 1993. 320p. Tese (Doutorado em Metodologia do Ensino) - Faculdade de Educação, UNICAMP, 1993.

RESUMO

A Faculdade de Enfermagem da PUCCAMP, buscando a consolidação de seu projeto educacional, elegeu, como prioridade, discutir sua prática de avaliação. A escolha intencional da avaliação, como objeto de questionamento, embasou-se na convicção de que esta prática é determinante na organização do trabalho pedagógico. Nessa perspectiva, a avaliação inscreve-se como principal evidenciadora do projeto político-pedagógico adotado pelo curso. A forma como é praticada a avaliação no microcosmo escolar, permite identificar quais os valores e os interesses que estão em jogo, e suas inevitáveis conseqüências extra-escola, ou seja, na organização social. A proposta metodológica fundamentou-se num trabalho coletivo de contínuo desvendamento da prática de avaliação vigente com subseqüente tomada de posição, objetivando uma intervenção planejada na realidade. Tanto o processo de apropriação dos dados como o de análise e intervenção, foram fruto da relação de parceria que se estabeleceu entre alunos e professores do curso, mediados pela ação política da pesquisadora que, simultaneamente, se responsabilizava pela coordenação do curso. A realidade dos dados apreendidos confirmou a práxis avaliativa como instrumento poderoso de qualificação do ensino. Revelou ser a avaliação prática permeada por relações de poder e fortemente impregnada de valores ideológicos que tanto podem servir para acelerar ou refrear as transformações no projeto institucional.

1994

BACCARELI, João Carlos. *Ocorrências de glândulas sebáceas ectópicas nas diversas áreas anatômicas da cavidade da boca*. São Paulo : [s.n.], 1994. 24p. Dissertação (Mestrado em Patologia) - Universidade Camilo Castelo Branco, 1994.

RESUMO

Foram examinados 1031 pacientes, de ambos os sexos, brancos e não brancos (4 a 80 anos de idade), inscritos na Clínica de Propedêutica Odontológica da PUCCAMP e de escolas públicas da região, com o objetivo de analisar a ocorrência de glândulas sebáceas ectópicas nas diversas áreas anatômicas da cavidade bucal. As características consideradas importantes para esta análise foram reunidas em fichas individuais elaboradas pelo autor. Constatou-se que a prevalência maior ocorre no lábio superior e, a associação entre lábios superior e inferior e mucosa jugal supera largamente qualquer outra localização.

FERNANDES, Arlete Maria dos Santos. *Incidência dos fatores de esterilidade conjugal nos hospitais universitários de Campinas no período de 1980 a 1991*. Campinas : [s.n.], 1994. 75p. Dissertação (Mestrado em Tocoginecologia) - Faculdade de Ciências Médicas, UNICAMP, 1994.

RESUMO

Este estudo analisou retrospectivamente algumas características demográficas, os fatores etiológicos e a taxa de abandono da população de 2331 casais que procuraram atendimento nos Serviços de Esterilidade dos hospitais universitários de Campinas, o da UNICAMP e o da PUCCAMP no período de 1980 a 1992. Encontrou-se que, aproximadamente 60% das mulheres tinham menos de 30 anos, e mais da metade dos casais apresentavam esterilidade primária. Os fatores etiológicos mais frequentes foram o tubáreo em 53% das mulheres atendidas, e o ovulatório em 30%. Contribuíram para a alta incidência do fator tubáreo as mulheres laqueadas que solicitaram reversão, que constituíram 24% do total de casos estudados. A taxa total de abandono nos dois serviços foi de 65,6%. As variáveis significativamente relacionadas ao abandono foram o fato do casal ser atendido na UNICAMP e mulheres que solicitaram reversão da laqueadura. Concluímos que devemos tomar medidas para diminuir o número de casos com fator tubáreo, prevenindo as infecções ginecológicas e melhorando a indicação da laqueadura, assim como, fornecendo métodos anticoncepcionais reversíveis ao alcance da população.

GARCIA, Rosa Wanda Diez. *Representações sociais da comida no meio urbano*: um estudo no centro da cidade de São Paulo. São Paulo : [s.n.], 1994. 219p. Dissertação (Mestrado em Comportamento Alimentar) - Instituto de Psicologia Social, USP, 1994.

RESUMO

Considerando as implicações que o modo de vida urbano imprime às práticas sociais, o presente trabalho pretendeu conhecer as representações sociais da comida e o modo de comer no meio urbano. Assumimos que a alimentação traz em seu bojo as inter-relações sócio-culturais e psicológicas, veiculando configurações concretas e simbólicas relacionadas como meio, construídas pelo pensamento social e vividas experimentalmente através do paladar. Utilizamos como objeto de estudo relatos de pessoas que trabalham e fazem refeições no centro da cidade de São Paulo. Abordamos, através da análise desses relatos e de observações feitas *in loco*, as representações sociais conjugadas às práticas alimentares, de modo que pudemos observar como se dá o imbricamento entre tais práticas e o universo simbólico. Os resultados foram organizados em três capítulos: repercussões do meio urbano na alimentação, o padrão alimentar e a alimentação sob a égide da saúde. No primeiro capítulo, exploramos os reflexos do modo de vida, que impõe ritmo, consumo e limites, como contexto para novas práticas que irão se estabelecendo e delineando as representações sociais. A relação de tempo e espaço remete-nos a duas instâncias onde habitualmente transcorrem as refeições: a casa e a rua. Esses dois domínios constituem categorias que orientam as representações sociais sobre a comida e podem estar, ora em posição, ora

sobrepondo-se uma à outra, ora independentes, constituindo substratos para as representações sociais da comida e influenciando o modo de comer. No capítulo sobre padrão alimentar exploramos determinantes dos hábitos alimentares, as modificações no ritual alimentar e suas implicações para o comportamento alimentar, o padrão alimentar urbano propriamente dito e a valorização da alimentação "natural". A alimentação sobre a égide da saúde aborda o forte vínculo que vem se estabelecendo entre a alimentação e a saúde e como, em decorrência desta associação, um caráter regulador e normativo passa a permear as práticas alimentares. Integrando as representações sociais sobre a comida, os elementos responsáveis pela associação da alimentação com a saúde irão infiltrar-se em outras representações de origens diversas.

GUIMARÃES, Kátia Regina Leoni Silva Lima de Queiroz. *Interrelação nutricional entre mãe e filho, focalizando a composição corporal nas idades adolescente e adulta*. Campinas : [s.n.], 1994. 280p. Dissertação (Mestrado em Nutrição) - Faculdade de Engenharia de Alimentos, UNICAMP, 1994.

RESUMO

Estudou-se a composição corporal de 111 nutrízes, com seus lactantes, divididas em dois grupos, adolescentes e adultas com idade variando de 13 a 19 anos e de 20 a 29 anos, respectivamente. As variáveis analisadas foram medidas antropométricas (peso, pregas cutâneas biceptal, triceptal subscapular e suprailíaca e circunferência braquial), idade materna, estatura materna, ganho ponderal materno, peso pré-gestacional, peso no pós-parto, idade ginecológica, idade da menarca, idade gestacional (semanas), escolaridade, estado marital, saneamento básico, tipo de aleitamento, sexo do recém nascido, idade gestacional por Capurro, peso ao nascer, comprimento, tempo de desmame. As medidas antropométricas foram avaliadas pelo modelo de regressão com coeficientes aleatórios, para o desenvolvimento do estudo longitudinal com medidas feitas em número de vezes e tempo diferentes. As medidas de peso e prega cutânea subscapular diminuíram significativamente nos dois grupos assim como as medidas do índice de massa corporal e massa de gordura. Circunferência muscular e massa magra, diminuíram no tempo indicando perda de fluidos ($p = 0,0006$) e ($p < 0,0001$), respectivamente, nos dois grupos. As mães adultas apresentaram sempre valores maiores de composição corporal. Os lactentes não apresentaram diferenças significativas entre os dois grupos. O índice de amamentação foi de 69,8% e 68,9%, para o aleitamento exclusivo para o grupo de adolescentes e adultas respectivamente.

MORAES, Sandra Pedrosa. *Estudo morfológico da mucosa enteral de reservatórios em "J"*. São Paulo: [s.n.], 1994, 82p. Dissertação (Mestrado em Técnica Operatória e Cirurgia Experimental) - Escola Paulista de Medicina, 1994.

RESUMO

A confecção de reservatórios ileais, após proctocolectomia, modifica a anatomia, a função e a morfologia do intestino delgado. Com o objetivo de avaliar se ocorriam alterações morfológicas da mucosa de revestimento dos reservatórios construídos e mantidos na continuidade do trânsito intestinal, foram operados 36 cães, separados em dois grupos. No I, foi realizada anastomose íntero-ental término-terminal, em plano único extramucoso; no II, foi confeccionado reservatório em forma de "J" no segmento cranial, que foi anastomosado ao segmento caudal, da mesma forma que no Grupo I. Seis cães, de cada grupo, foram mortos aos 21, 42 e 63 dias, para estudo morfológico e morfométrico da mucosa enteral. Os resultados demonstraram diminuição da altura dos vilos, do número de células caliciformes e das mitoses em ambos os grupos, mas as alterações mais intensas foram nos cães do Grupo II, e somente neles diminuiu a profundidade das criptas intestinais. Aos 63 dias, na comparação entre dois grupos, havia diferença significativamente na altura dos vilos e no número de mitoses nas criptas. Concluiu-se que a confecção de reservatório estabeleceu alteração morfológica da mucosa enteral que o revestia, mesmo quando mantida na continuidade do trânsito intestinal.

MOURA, Erly Catarina. *Avaliação de serviços de saúde: um desenho epidemiológico*. Campinas : [s.n.], 1994. Tese (Doutorado em Saúde Coletiva) - Faculdade de Ciências Médicas, Departamento de Medicina Preventiva e Social, UNICAMP, 1994.

RESUMO

Inicialmente, a partir da revisão da literatura sobre avaliação de serviços de saúde e epidemiologia da saúde materno-infantil, justificamos a importância de avaliar os serviços de saúde, públicos e privados, utilizados pela população materno-infantil, enquanto impacto das ações de saúde (resultados), a partir de indicadores do processo de assistência à saúde, guardadas as devidas dimensões próprias da epidemiologia de modo a incorporar o conceito de risco/proteção ("marcador"). Em decorrência, fornecer subsídios para o planejamento em saúde a fim de contribuir para a consolidação do Sistema Único de Saúde, conforme consta dos nossos objetivos. A metodologia usada é o estudo tipo coorte junto à população materno-infantil do Jardim Campos Elíseos, periferia do município de Campinas, caracterizada conforme a situação social (condições de vida, condições de moradia e condições de saneamento), nutricional (antropometria, alimentação e amamentação) e assistencial (demanda de saúde, processo de assistência, impacto das ações de saúde e participação popular no sistema de saúde) no que se refere aos equipamentos de saúde, conforme o tipo de serviço utilizado. Os resultados mostram que houve uma melhora geral no quadro epidemiológico das populações estudadas,

independente do tipo de serviço de saúde utilizado. Encontrou-se diferença significativa, entre as populações dos diferentes serviços, quanto às variáveis sociais para renda, anos de estudo materno e localização da moradia, quanto às variáveis nutricionais para estado nutricional pré-gestacional, ganho de peso na gestação e consumo de frutas para as gestantes e idade de introdução de frutas para as crianças. Quanto aos indicadores de processo, observou-se diferença para idade na primeira consulta de pré-natal e puericultura, tempo de espera, número de serviços de saúde utilizados pela criança e satisfação com o atendimento, negativamente para o serviço público. No que se refere aos indicadores de impacto, encontrou-se diferença para tipo de parto e tipo de alojamento ao nascer, negativamente para o serviço privado. Sugere-se a adoção destes indicadores na monitorização da avaliação de serviços de saúde, buscando a melhoria do atendimento público e o direito à saúde de alta qualidade para todos os cidadãos.

SOARES, Maria Magali Stelato Rocha. *Incidência de dermatose podal em diferentes classes de indivíduos e antibiograma dos fungos isolados*. São Paulo : [s.n.], 1994. 199p. Dissertação (Mestrado em Análises Clínicas) - Faculdade de Ciências Farmacêutica, USP, 1994.

RESUMO

Neste trabalho, foram incluídos dois grupos de indivíduos considerados saudáveis, formados, respectivamente, por militares e estudantes universitários, e um grupo de imunodeprimidos, formado por transplantados renais. A partir desses grupos, foi estudada a correlação entre a presença de lesões podais, ocorrência de fatores predisponentes à aquisição de micoses e decação de fungos. A incidência das espécies isoladas e a sensibilidade das mesmas frente a diferentes antifúngicos também foram consideradas. A presença de lesões podais, mostrou relação com a presença de fungos, principalmente de dermatófitos e em indivíduos imunodeficientes. Destes pacientes e de militares, *Trichophyton rubrum* foi o fungo mais freqüente isolado, igualando-se ao isolamento de *T. mentagrophytes* entre os universitários. Fatores predisponentes à aquisição de micoses foram significativos na dependência da análise realizada: inter-grupo ou entre grupos. Em antibiogramas, as drogas poliênicas e azólicas, assim como a griseofulvina, mostraram-se principalmente fungistáticas contra as cepas isoladas. Entre os dermatófitos, os oriundos de transplantados, foram menos sensíveis à determinadas concentrações dos antifúngicos.

1995

CORDEIRO, Fernando. *Anastomose mecânica em reto extraperitoneal*: duas técnicas de reconstrução; estudo experimental comparativo em cães. Campinas : [s.n.], 1995. 108p. Tese (Doutorado em Cirurgia) - Faculdade de Ciências Médicas, UNICAMP, 1995.

RESUMO

Os problemas resultantes das anastomoses no reto abaixo da reflexão peritoneal continuam sendo tema de discussões. Com o desenvolvimento de novas técnicas pode-se estender a ressecção anterior aos segmentos retais mais baixos com preservação do mecanismo esfinteriano, porém a segurança destes procedimentos está por ser estabelecida. Este estudo comparativo randomizado entre duas técnicas de anastomose mecânica no reto de cães, abaixo da reflexão peritoneal, permitiu a elaboração deste trabalho. Para isso, submeteram-se vinte animais à retocolectomia, efetuando-se a reconstrução do trânsito intestinal por dois métodos: em um grupo de dez cães, pela sutura mecânica circular de maneira término-terminal dita direta e, em outro, pela sutura circular, através do fechamento linear do coto retal de maneira término-lateral terminalizada dita dupla. As suturas foram avaliadas aos quinze dias do pós-operatório, com atenção ao estudo macro e microscópico das anastomoses e das complicações a elas atribuíveis principalmente à estenose. A análise desse estudo permitiu concluir: (1) a avaliação macroscópica da cicatrização, tanto interna quanto externamente, não revelou diferença significativa entre as duas técnicas de anastomose; (2) a avaliação microscópica na anastomose, ao décimo quinto dia do pós-operatório, mostrou não haver diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos; (3) a prevalência de estenose foi baixa em ambas as técnicas de anastomose mecânica, sem diferença significativa, não havendo relação entre um menor calibre do aparelho de sutura automática e um maior índice de estenose; (4) a ausência de diferença de resistência têxtil, de deiscência, fístula e hemorragia na linha de anastomose e de mortalidade de ambos os grupos revelou que ambas as técnicas de anastomose mecânica se equivaleram, e (5) as anastomoses mecânicas direta e dupla foram técnicas válidas e seguras nas cirurgias no reto extraperitoneal de cães.